

## Fiche technique précautions complémentaires air : les précautions complémentaires s'ajoutent toujours aux précautions standards

	<b>Chambre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le patient reste dans sa chambre, porte fermée.</li> <li>- La chambre est aérée fréquemment.</li> </ul>
	<b>Signalisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prescription médicale dans le dossier patient informatique (allergies/risques), générant une alerte.</li> <li>- Affichage de cette fiche technique précautions complémentaires air par nos partenaires libéraux visible de tous (porte de la chambre...).</li> <li>- Durée des précautions = durée de contagiosité sur prescription médicale.</li> </ul>
	<b>Information patient/entourage/libéraux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informer le patient/entourage/intervenant libéral.</li> <li>- Eduquer et inciter le patient/entourage/intervenant libéral à la friction hydroalcoolique des mains ou au lavage des mains.</li> </ul>
	<b>Hygiène des mains</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friction hydroalcoolique des mains systématique après tout contact avec le patient et son environnement, <b>avant de sortir de la pièce où se trouve le patient et après le retrait du masque.</b></li> </ul>
	<b>Gants à usage unique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uniquement dans le cadre des précautions standards.</li> <li>- A éliminer dans la chambre.</li> </ul>
	<b>Tenue</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Port d'une surblouse à manche longue à UU lors de tout contact avec le patient et son environnement.</li> <li>- A éliminer à la sortie de la chambre dans la filière ménagère.</li> </ul>
	<b>Masque</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Patient</b> : port d'un masque chirurgical avant la sortie de la chambre</li> <li>- <b>Famille et visiteur</b> : port d'un masque FFP2 avant d'entrer dans la chambre pour la famille et les visiteurs si contact proche, retiré après la sortie de la chambre</li> <li>- <b>Professionnel</b> : port d'un masque FFP2 <b>avant d'entrer au domicile du patient, à retirer après la sortie du domicile.</b></li> </ul>
	<b>Matériel de soins</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Privilégier l'usage unique ou matériel dédié</li> <li>- Limiter au strict nécessaire le stock de matériel entrant au domicile du patient.</li> <li>- Si matériel réutilisable, nettoyer et désinfecter immédiatement après utilisation avec un détergent-désinfectant.</li> </ul>
	<b>Entretien des locaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bionettoyage avec un détergent/désinfectant <b>dès la fin des soins</b> de toutes les surfaces manipulées (environnement proche du patient).</li> <li>- <b>Aération plusieurs fois / jour</b> de la pièce en ouvrant fenêtre, <b>porte fermée</b>. Le domicile doit être aéré régulièrement.</li> </ul>
	<b>Gestion des déchets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tri habituel (DAOM et/ou DASRI) : Cf. la procédure sur la gestion des déchets sur le <a href="http://www.hadfrance.fr">site internet de l'HAD</a></li> </ul>
	<b>Gestion du linge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manipuler le linge souillé avec des gants et une tenue de protection</li> <li>- Entretien standard en machine à laver à domicile</li> </ul>
	<b>Déplacement du patient en dehors de chez lui</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si le patient doit sortir de chez lui (consultation – hospitalisation) : port du masque chirurgical</li> </ul>
	<b>Transmission de l'information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information de l'ensemble des intervenants extérieurs à l'HAD qui doivent respecter les mêmes précautions</li> <li>- En cas de <b>transfert</b> du patient (autre établissement, consultation...) : <b>informer le médecin et/ou service receveur</b> ainsi que la société de transport sanitaire</li> <li>- Transmission téléphonique ou orale directe <b>et</b> utilisation des supports de transmissions.</li> </ul>
	<b>Levée des précautions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminer le matériel à usage unique non utilisé.</li> <li>- Nettoyer et désinfecter le matériel réutilisable (stéthoscope, tensiomètre...) avec un détergent-désinfectant.</li> <li>- <b>Attention : aérer la pièce pendant au moins 2 heures</b></li> <li>- <b>Seul un médecin peut déterminer la levée des précautions complémentaires.</b></li> </ul>