

Fiche technique précautions complémentaires contact : les précautions complémentaires s'ajoutent toujours aux précautions standards

	Signalisation	<ul style="list-style-type: none"> - Prescription médicale dans le dossier patient informatique (allergies/risques), générant une alerte. - Insertion de cette fiche technique précautions complémentaires contact dans le dossier. - Durée des précautions = durée de contagiosité
	Information patient/entourage/libéraux	<ul style="list-style-type: none"> - Informer, éduquer et inciter le patient/l'entourage/les intervenants extérieurs à la friction hydroalcoolique des mains ou au lavage des mains. - port d'un masque chirurgical pour la famille et les visiteurs si contact proche. <p>NB : port de surblouse et de gants pour l'entourage si diarrhées à clostridium difficile, gale ou pédiculose.</p>
	Hygiène des mains	<ul style="list-style-type: none"> - Friction hydroalcoolique des mains systématique après tout contact avec le patient et son environnement, après le retrait des accessoires de protection et avant de sortir du domicile. <p>NB : la friction doit être précédée d'un lavage simple si diarrhées à clostridium difficile, gale ou pédiculose.</p>
	Gants à usage unique	<ul style="list-style-type: none"> - Uniquement dans le cadre des précautions standards. - A éliminer dans la chambre. <p>NB : systématique pour tout soin si diarrhées à clostridium difficile, gale ou pédiculose.</p>
	Tenue	<ul style="list-style-type: none"> - Pour tout contact direct avec le patient et/ou son environnement - A éliminer dans la chambre. <p>NB : port de surblouse et de gants pour l'entourage si diarrhées à clostridium difficile, gale ou pédiculose + tabliers imperméables si soins mouillants.</p>
	Masque	<ul style="list-style-type: none"> - Masque uniquement dans le cadre des précautions standard. <p>NB : port du masque si vomissement du patient.</p>
	Matériel de soins	<ul style="list-style-type: none"> - Privilégier l'usage unique. - Limiter au strict nécessaire le stock de matériel entrant au domicile du patient. - Si matériel réutilisable, nettoyer et désinfecter immédiatement après utilisation avec un détergent-désinfectant. <p>NB : si clostridium difficile désinfection à l'eau de javel.</p>
	Entretien des locaux	<ul style="list-style-type: none"> - Bionettoyage avec un détergent/désinfectant dès la fin des soins de toutes les surfaces manipulées (environnement proche du patient).
	Gestion des déchets	<ul style="list-style-type: none"> - Tri habituel (DAOM et/ou DASRI). Cf. la procédure sur la gestion des déchets sur le site internet de l'HAD <p>NB : si clostridium difficile, BMR, BHR e filière DASRI pour tout déchet/matériel même inutilisé.</p>
	Excrétas et liquides biologiques	<ul style="list-style-type: none"> - Port de gants et tenue de protection. - Utilisation de toilette individuelles - Si nécessité d'un bassin : usage unique, avec sac et élimination dans DASRI. - Frictions SHA après manipulation
	Gestion du linge	<ul style="list-style-type: none"> - Manipuler le linge souillé avec des gants et une tenue de protection - Entretien standard en machine à laver à domicile. <p>NB : si gale ou pédiculose ne pas mélanger le linge, laver à + de 60°</p>
	Déplacement du patient en dehors de chez lui	<ul style="list-style-type: none"> - Déplacements soumis à conditions : isoler le matériel infectieux (pus, urines...) par un pansement ou une protection. Eduquer le patient à régulièrement faire des frictions au SHA, pas de contact avec personnes vulnérables. <p>NB : si clostridium difficile ou gale sortie à proscrire.</p>
	Transmission de l'information	<ul style="list-style-type: none"> - Information de l'ensemble des intervenants extérieurs à l'HAD qui doivent respecter les mêmes précautions - En cas de transfert du patient (autre établissement, consultation...) : informer le médecin et/ou service receveur ainsi que la société de transport sanitaire - Transmission téléphonique ou orale directe et utilisation des supports de communications papier
	Levée des précautions	<ul style="list-style-type: none"> - Sur prescription médicale. - Eliminer le matériel à usage unique non utilisé. - Nettoyer et désinfecter le matériel réutilisable (stéthoscope, tensiomètre...) avec un détergent-désinfectant.